

# ОТЁЛ

## Рождение – это старт в жизнь

**Осложнения при отелях должны быть исключены путем соблюдения соответствующих условий содержания ....**

**1.** Следует избегать ожирения маточного поголовья в последние дни лактации и в сухостойный период показатель BCS (body condition scoring) должен быть менее 3,75. Данный показатель отражает упитанность животного по 5-ти бальной шкале с шагом 0,25 ед.

**2.** Наличие в рационе минеральных добавок в течение последних недель стельности коров (также и первотелок)

**3.** Профилактика послеродового пареза у коров

- сенаж с не удобляемых площадей (сено и кукурузный силос)
- одноразовое введение витамина D в течение пяти дней до отела
- по обстоятельствам кислую соль (рН мочи должна быть в пределах 6,0–6,5)

**4.** Оптимально обустроенные боксы для отела:

- 4 бокса на каждые 100 коров;
- площадь не менее 12 м<sup>2</sup>;
- контакт с другими животными;
- отсутствие сквозняков, соблюдение чистоты, т.е. частое удаление навоза (минимум после каждого третьего отела)

**5.** При отеле животное должно лежать; требуется максимально 2 человека для принятия отела

- вытягивать теленка необходимо только во время родовых схваток
- следует обращать внимание на паузы между схватками

**6.** При отклонениях от обычных признаков начала отела прибегают к помощи ветеринара (через 2-3 часа после лопания плодного пузыря должен отмечаться прогресс отела)

**7.** Новорожденный теленок

- необходимо обтереть теленка для удаления слизи;
- обливка холодной водой для побуждения к дыханию;
- теленка приводят в горизонтальное положение (укладывают на живот)
- хорошо обтирают теленка или позволяют корове тщательно его облизать;
- быстро перемещают его в специальный домик (Iglu).



Отведененный для отела отсек должен быть удобным для контроля и достаточно большим по площади



Контроль отела и при необходимости оказание помощи предотвращают получение мертворожденных телят



Новорожденные телята должны быть быстро обсушены!