

КОРМЛЕНИЕ

В кормлении племенного теленка важную роль играют количество и качество кормов

Телята не должны отставать от нормально развивающихся сверстников уже в течение первых недель жизни. Высокие приrostы в первые недели создают предпосылки для хорошей конституции, раннего возраста первого отела и высокой молочной производительности.

Требования к выпойке молока в течение первых недель жизни теленка

1. Очень молодые телята способны переваривать только ингредиенты молока
2. Первую неделю молоко нужно выпаивать три раза в день
3. Цельное молоко должно выпаиваться ежедневно в количестве примерно 6 литров в расчете на одного теленка
 - При этом следует обращать внимание и температуру молока (40°C) и соблюдение гигиены
 - Цельное молоко содержит не достаточное количество микроэлементов, поэтому рекомендовано



При выпойке молока должны быть соблюдены соответствующие условия...



Хорошо развитый молодняк – залог высокой производительности молочного стада в будущем!

применять специальные добавки

4. При использовании заменителей молока нужно обращать внимание на их качество:
 - менее 10% сырой золы;
 - менее 0,1% клетчатки;
 - по возможности отсутствие растворимых протеинов.

5. Достаточное кормление: 1 кг заменителя молока позволяет получать 400 г прироста в день в первые четыре недели жизни.
6. Доступ к воде должен быть обеспечен с первого дня, сено и стартовый рацион - со второй недели жизни.

При выращивании молодняка вплоть до достижения возраста отела придерживаются следующих правил

1. Правильный уход за молодняком существенно увеличивает срок его хозяйственного использования в будущем, а это значит производительность за лактацию и пожизненную молочную производительность.

2. Высокие приrostы до 8-го месяца жизни существенны для формирования экстерьера животных:

- нужно стремиться к достижению привеса - 850 г/сутки;
- рацион должен включать в себя качественный основной корм и до 2 кг концентратов ежедневно;

Литров/день



- должен быть контроль над обеспеченностью минеральными добавками.

3. В последующий период:

- среднесуточный прирост не должен превышать 750 г/день, чтобы не допустить возникновения ожирения;
- исключают из рациона концентрированные корма и по возможности ограничивают включение в него кукурузного силюса.

- ### 4. Осеменение при достижении живой массы 400-430 кг возможно на 15-м месяце жизни, а первого отела в возрасте 24-х месяцев, это позволяет:

- снизить издержки при разведении животных;
- снижение осложнений после отловов;
- получить высокий урожай уже при первой лактации.

- ### 5. Пастбищное содержание возможно уже на втором году жизни, при этом необходимы:

- контроль минеральной обеспеченности рациона;
- проведение регулярной дегельминтизации.